

WeJoint® +plus

NEO

Με Κολλαγόνο
Τύπου II

Το επόμενο βήμα στην υποστήριξη των αρθρώσεων



wepharm®
Animal Welfare

wepharm.pt

WeJoint®
Εύγευστα Δισκία



Συμπλήρωμα διατροφής για
σκύλους και γάτες σχεδιασμένο να
παρέχει θρεπτική υποστήριξη και
ενδυνάμωση της υγείας των
αρθρώσεων.

Συστήνεται για νεαρά αναπτυσσόμενα,
ενήλικα & υπερήλικα ζώα, με υψηλή
σωματική άσκηση ή σε κάθε περίπτωση
αρθροπάθειας (φλεγμονή, τραυματική,
εκφυλιστική, ή όπου υπάρχει
δυσλειτουργία άρθρωσης).

Συσκευασία:

WeJoint Plus® Small Breed and Cats: 30 δισκία
WeJoint Plus® Small Breed and Cats: 120 δισκία
WeJoint Plus® Medium Breed: 30 δισκία
WeJoint Plus® Medium Breed: 120 δισκία
WeJoint Plus® Large Breed: 30 δισκία
WeJoint Plus® Large Breed: 120 δισκία



References:

(a) Gruenewald J et al 2009. Adv Ther. Effect of glucosamine sulphate with or without omega-3 fatty acids in patients with osteoarthritis. Vol. 26(9), pp. 858-871. (b) Anderson et al 1999; Preventive Vet. Med Vol.38: 65-73. (c) McCarthy G, O'Donovan J, et al Veterinary Journal (2007) Randomised double-blind, positive-controlled trial to assess the efficacy of glucosamine/chondroitin sulfate for the treatment of dogs with osteoarthritis. 2007 Jul; 174(1):54-61. (d) Park J.S et al 2010. Nutrition and metabolism Vol. 7:18. Astaxanthin decreased oxidative stress and inflammation and enhanced immune response in humans. (g) Clegg D.O. et al 2006 New Eng. J. Med. Glucosamine, chondroitin sulfate and the two in combination for painful knee osteoarthritis. Vol.354 No.8 pp. 795-808. (h) Roush J.K. et al 2010. J Am Vet Med Assoc, Evaluation of the effects of dietary supplementation with fish oil omega-3 fatty acids on weight bearing in dogs with osteoarthritis. Vol. 236, No.1, pp. 67-73. (e) Deutsch L. et al 2007. Journal of the American College of Nutrition. Evaluation of the Effect of Neptune Krill Oil on Chronic Inflammation and Arthritic Symptoms. Vol. 26, No. 1, pp. 39-48. (f) Ezaki, Junko, Journal of Bone and Mineral Metabolism, Assessment of safety and efficacy of methylsulfonylmethane on bone and knee joints in osteoarthritis animal model. 2013 Vol.31, Issue 1, pp 16-25. (g) Aragon, Carlos L., JAVMA, Systematic review of clinical trials of treatments for osteoarthritis in dogs Vol 230, No. 4, February 15, 2007. (h) Gupta, R.P. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Comparative therapeutic efficacy and safety of type-II collagen (uc-II), glucosamine and chondroitin in arthritic dogs: pain evaluation by ground force plate. 96 (2012) 770-777. (i) Tong T. et al (2010) Chicken type II collagen induced immune balance of main subtype of helper T cells in mesenteric lymph node lymphocytes in rats with collagen-induced arthritis Inflamm Res. 2010 May;59(5):369-77. (j) Di Cesare Mannelli L, et al. 2013 Low dose native type II collagen prevents pain in a rat osteoarthritis model. BMC Musculoskelet Disord. (k) Trc.T. & Bohmova.J. et al.(2010) Efficacy and tolerance of enzymatic hydrolysed collagen (EHC) vs. glucosamine sulphate (GS) in the treatment of knee osteoarthritis (KOA). Int. Orthopedics. (l) Vandeweerdt et al (2012) Systematic Review of Efficacy of Nutraceuticals to Alleviate Clinical Signs of Osteoarthritis. J Vet Intern Med 2012;26:448-456. (m) "Dietary of omega-3 fatty acids was the only nutraceutical showed a high level of evidence for treatment" BSAVA Congress Proceedings, Birmingham 2015 pag. 131. (n) Abdul Hasseb et al (2017) Harpagoside suppresses IL-6 expression in primary human osteoarthritis chondrocytes J Orthop Res. Author manuscript; available in PMC 2018 February 01.

Σύνθεση WeJoint Plus® (σε mg / δισκίο):

WeJoint® Plus	Large Breed	Medium Breed	Small Breed and Cats
Υδροχλωρική γλυκοζαμίνη	500	360	250
+ Φυσικό Κολλαγόνο Τύπου II	40	20	10
Θειική Χονδροϊτίνη	200	135	100
Οργανικό Θείο (MSM)	125	90	60
Έλαιο Krill (EFA)	100	70	40
+ Αρπαγόφυτο (<i>Harpagophytum Procumbens</i>)	4.8	3.36	1.6
Βιταμίνη C	50	35	22
Θειικός Ψευδάργυρος	30 / 10.92	20 / 7.28	15 / 6.64
Θειικό Μαγγάνιο	6.2 / 2	6.2 / 2	6.2 / 2

Προτεινόμενη δοσολογία:

Μέγεθος Ζώου	Δόση
Ζώα μέχρι 10 κιλά:	1 δισκίο WeJoint® Plus Small breed and Cats ημερησίως
Ζώα από 10-25 κιλά:	1 δισκίο WeJoint® Plus Medium Breed ημερησίως
Ζώα από 25-40 κιλά:	1 δισκίο WeJoint® Plus Large Breed ημερησίως
Ζώα άνω 40 κιλών:	2 δισκία WeJoint® Plus Large Breed ημερησίως

Στην αρχική χορήγηση (εφόδου) ή σε οξείες περιπτώσεις συνίσταται ο διπλασιασμός της προτεινόμενης δόσης για μια περίοδο 15 ημερών. Συνίσταται η συμβουλή του κτηνιάτρου πριν από τη χρήση.

Αποθηκεύστε σε ξηρό κλίμα, σε θερμοκρασία κάτω των 25°C και μακριά από το ηλιακό φως. Όχι για ανθρώπινη κατανάλωση.

WePharm, S.A.

Rua Principal, Lote 12/16C
Zona Industrial de Porto de Mós
2480-407 Porto de Mós
PORTUGAL

tel +351 244 768 700
fax +351 244 768 705
info@wepharm.pt



Know us better!
wepharm.pt

facebook.com/wepharm


ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ: JMCO - I. ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΙΚΕ
ΑΘΗΝΑ: 210 60 11 640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 23920 72020
info@jmco.gr, www.jmco.gr

WeJoint® +plus

Το WeJoint® Plus με τον μοναδικό του συνδυασμό εγγυάται ενίσχυση των αρθρώσεων, αναγεννητικό αποτέλεσμα καθώς και διαχείριση του πόνου και της φλεγμονής.

Η πιθανότητα εμφάνισης αρθροπαθειών στα μικρά ζώα είναι υψηλή. Μπορεί να προκληθούν από υπερφόρτωση σε μια υγιή άρθρωση ή από κανονικό βάρος σε άρθρωση με κακή προδιάθεση.

Μια προληπτική προσέγγιση και κατάλληλη θεραπεία επιτρέπει αποκατάσταση της ποιοτικής ζωής του ζώου που υποφέρει από οστεοαρθρίτιδα ή ακόμα και να αποτρέψει την εκδήλωσή της. Ο παράγοντας κλειδί βρίσκεται στην χρήση ενός κορυφαίας ποιότητας χονδροπροστατευτικού σκευάσματος.



ΝΕΟ
Με Κολлагόνο
Τύπου II

Το WeJoint® Plus προσφέρει βελτιωμένη δραστικότητα και καλύτερη διαχείριση σε καταστάσεις πόνου και φλεγμονής.

Οι επιφάνειες των αρθρώσεων καλύπτονται από χόνδρους που είναι υπεύθυνοι για την απορρόφηση κραδασμών, διευκολύνουν την ολίσθηση και είναι απαραίτητοι για τον σχηματισμό και ανάπτυξη μεγάλων οστών. Ο χόνδρος αποτελείται από τα χονδροκύτταρα και την εξωκυττάρια μήτρα. Τα χονδροκύτταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των συστατικών του χόνδρου, δηλαδή του κολлагόνου και των πρωτεογλυκανών. Η αρθρική μεμβράνη παράγει το αρθρικό υγρό με ιξωδοελαστικά και λιπαντικά χαρακτηριστικά.

Με την εμφάνιση της φλεγμονής, οι φλεγμονώδεις μεσολαβητές και τα ένζυμα που απελευθερώνονται προκαλούν αρνητικό αποτέλεσμα, μειώνοντας την παραγωγή των δομικών συστατικών του χόνδρου και προωθώντας την αποικοδόμηση.

Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε απώλεια της ελαστικότητας της άρθρωσης καθώς και σε υψηλά επίπεδα πόνου.

Είναι επομένως απαραίτητο να σταματήσει αυτή η διαδικασία αποικοδόμησης και φλεγμονής, προσφέροντας στο ζώο υψηλότερη ποιότητα ζωής. Με την σύνθεσή του, το **WeJoint® Plus** προσφέρει μια πολύπλευρη προσέγγιση για αποτελεσματική δράση στις παθήσεις των αρθρώσεων. Ακόμη, προτείνεται για χορήγηση σε νεαρά και αναπτυσσόμενα ζώα.

ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΓΛΥΚΟΖΑΜΙΝΗ

Απαραίτητη για την συντήρηση της λειτουργίας της άρθρωσης καθώς και για την σύνθεση των γλυκοζαμινογλυκανών που αποτελούν μέρος των χόνδρων και του αρθρικού υγρού. Αυξάνει την κινητικότητα της άρθρωσης, την ελαστικότητα και την αντοχή της αρθρικής δομής. Μια πηγή Γλυκοζαμίνης σε υδροχλωρική μορφή, η οποία παρέχει υψηλή διαθεσιμότητα.

ΑΡΠΑΓΟΦΥΤΟ (HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS)

Προσφέρει αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές ιδιότητες, ιδιαίτερα στην διαχείριση επώδυνων καταστάσεων πόνου των αρθρώσεων. Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να αναστείλει τους τρόπους μεταβολισμού του αραχιδονικού οξέος, της κυκλοοξυγενάσης (COX) και λιποξυγενάσης (LOX), μειώνοντας την παραγωγή εικοσανοειδών όπως οι προσταγλανδίνες. Σχετικά με την αναστολή του COX, το αρπαγόφυτο φαίνεται να αναστέλλει συγκεκριμένα το COX-2 αλλά όχι το COX-1, γεγονός που μπορεί να εξηγήσει την υψηλή ανοχή του και τις μειωμένες παρενέργειες, σε αντίθεση με τα ΜΣΑΦ που αναστέλλουν και τις 2 ισομορφές του ενζύμου.

ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΘΕΙΟ (MSM)

Ικανό για την μείωση φλεγμονών και ελέγχου του πόνου στις περιπτώσεις αρθροπαθειών. Επιτρέπει μια ξεκάθαρη βελτίωση στην ποιότητα ζωής καθώς και βελτιωμένη κινητικότητα της άρθρωσης.

ΒΙΤΑΜΙΝΗ C

Το πρωτεύων σωματικό αντιοξειδωτικό. Το ασκορβικό οξύ εξουδετερώνει την επίδραση των ελευθέρων ριζών που παράγονται στην δομή της άρθρωσης. Επίσης παίζει σημαντικό ρόλο σαν μεταβολικός παράγοντας στις αρθρικές λειτουργίες.

ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΤΥΠΟΥ II

Το κολлагόνο έχει δομικό ρόλο στις αρθρώσεις, αποτελώντας το κύριο συστατικό των χόνδρων. Το φυσικό κολлагόνο τύπου II προσφέρει ειδική δράση στις αρθρώσεις, μειώνοντας την φλεγμονή και την αποικοδόμηση του κολлагόνου που υπάρχει ήδη στην άρθρωση. Η παρουσία Κολлагόνου τύπου II οδηγεί σε μείωση της απόκρισης του ανοσοποιητικού και έκφρασης της κολлагενάσης, που είναι υπεύθυνη για τον καταστροφικό κύκλο στο χόνδρο.

ΘΕΙΙΚΗ ΧΟΝΔΡΟΪΤΙΝΗ

Υπεύθυνη για την τόνωση της παραγωγής γλυκοζαμινογλυκανών στα χονδροκύτταρα και την προώθηση της ικανότητας απορρόφησης κραδασμών από τον χόνδρο. Μαζί με το κολлагόνο διατηρεί το επίπεδο ρευσιτότητας και την ισορροπία του αρθρικού υγρού και εξασφαλίζει την μέγιστη διάταση του χόνδρου.

ΕΛΑΙΟ KRILL (EFA) - Ω3

Η πιο βιοδιαθέσιμη και καθαρή πηγή Ωμέγα 3 απαραίτητων λιπαρών οξέων - Εικοσιπεντανοϊκό οξύ (EPA) και δοκοσαεξανοϊκό οξύ (DHA) - με αποδεδειγμένη δράση στον έλεγχο και την εκδήλωση προφλεγμονωδών και αντιφλεγμονωδών μεσολαβητών (κυτοκίνες και λευκοτρίνες) καθώς και γονιδιακής έκφρασης των ΜΣΑΦ (COX-2). Πλούσιο σε ασταξανθίνη, ένα πανίσχυρο αντιοξειδωτικό της οικογένειας των καροτενοειδών, με δεδομένη αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση. Η ενσωμάτωση της ασταξανθίνης σε φόρμες μικκυλίων από τα φωσφολιπίδια Ωμέγα 3 επιτρέπει ιδανική απορρόφηση καθιστώντας το έλαιο Krill υψηλά βιοδιαθέσιμο.

ΘΕΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ

Ένα ολιγοστοιχείο κλειδί για την διατροφή, απαραίτητο στις ενζυματικές λειτουργίες του σώματος. Ιδιαίτερα σημαντικό στον σχηματισμό χόνδρων.

ΜΑΓΓΑΝΙΟ

Αυτό το ολιγοστοιχείο είναι ο πιο κοινός παράγοντας για τις γλυκοζυλοτρανσφεράσες, απαραίτητα ένζυμα στην σύνθεση των πρωτεογλυκανών που χρειάζονται στην ανάπτυξη του χόνδρου και του οστού.